

EVOLUTIA RUJEOLEI IN ROMANIA, 2016

In perioada ianuarie – august, 2016 in Romania au fost confirmate **675** cazuri de rujeola in 23 de judete. Au fost raportate **3 decese** prin rujeola.

Majoritatea cazurilor reprezinta focare de comunitati cu acoperiri vaccinale suboptimale. Familii din aceste comunitati calatoresc in mod repetat in afara tarii (ex. Italia) si migreaza alternativ intre judete invecinate; o parte din acestea nu sunt pe listele niciunui medic de familie, alta parte insa, datorita deplasarilor frecvente, nu se prezinta cu copiii la vaccinare. Focarele, in mare parte in evolutie, au fost constituite astfel:

- la granita dintre judetele Bistrita Nasaud si Cluj (219 cazuri din care 7 au fost cazuri de rujeola nosocomiala); in jud. Bistrita Nasaud – 127 cazuri si in jud.Cluj – 92 cazuri
- in judetul Mures (145 cazuri)
- in judetul Arad (113 cazuri din care 2 decese la copii cu varsta sub 1 an care s-au prezentat tardiv la spital)
- in judetul Timis (71 cazuri din care 1 deces la copil cu varsta sub 1 an cu spitalizari prelungite, avand in antecedente bronsiolita emfizematoasa, otita medie supurata)
- in judetul Suceava (27 cazuri)
- in judetul Brasov (33 cazuri)
- in judetul Salaj (7 cazuri) - focar inchis; in luna august a fost confirmat 1 caz nou
- in judetul Hunedoara (14 cazuri)
- in judetul Caras - Severin (13 cazuri); patru din aceste cazuri au aparut intr-un focar de scarlatina
- in judetul Alba (3 cazuri) – focar inchis; in luna august a fost confirmat 1 caz nou

Cazuri sporadice de rujeola au fost confirmate la persoane nevaccinate/incomplet vaccinate din Bucuresti (4 cazuri) si din judetele:

- Bacau (3 cazuri)
- Bihor (1 caz)
- Constanta (3 cazuri)
- Dambovita (2 cazuri)
- Giurgiu (1 caz)
- Iasi (5 cazuri)
- Mehedinți (1 caz)
- Neamt (2 cazuri)
- Olt (2 cazuri)
- Sibiu (3 caz)
- Vaslui (1 caz)

Repartitia numarului de cazuri de rujeola pe grupe de varsta si pe status vaccinal pentru perioada mentionata este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. doze vaccin in antecedente	Grupa de varsta										TOTAL
	<1 an	1-4 ani	5-9 ani	10-14 ani	15-19 ani	20-24 ani	25-29 ani	30-34 ani	35-39 ani	40-44 ani	
0	125	276	90	48	16	7	10	10	5	10	597
1	0	22	16	3	4	2	2	0	4	0	53
2	0	1	3	9	5	5	2	0	0	0	25
TOTAL	125	299	109	60	25	14	14	10	9	10	675

Ca interventie in focare au fost organizate actiuni de vaccinare cu RRO a copiilor incomplet vaccinati/nevaccinati. Pana in luna august, inclusiv, in regiunile afectate au fost recuperati la vaccinare 573 de copii cu varste intre 1 – 15 ani.

Reactiile adverse postvaccinale inregistrate la vaccinul RRO in anul 2016 au fost in numar de 3 ceea ce reprezinta o incidenta de 0,001 la 100 de copii vaccinati.

Distributia geografica a cazurilor de rujeola notificate in perioada mentionata este prezentata in figura de mai jos:




Fig. 1

In epidemiei actuala de rujeola tulpina de virus rujeolic identificata a fost de import (B3) diferita fata de tulpina endemica din Romania (D4)